

Parlando un po'  
di lepri .....

Serata divulgativa con gli  
appassionati cacciatori dell'ATC MO1

# Conoscere la risorsa

## Cosa sappiamo della lepre ?

- Comportamento e ritmi di attività
- Alimentazione
- Preferenze ambientali
- Ciclo annuale e riproduzione
- Successo riproduttivo
- Mortalità annuale e giovanile
- Ecc. ecc.



# Successo riproduttivo, ovvero

- Unità di misura utilizzata per determinare il successo riproduttivo di una specie, ovvero la differenza tra la popolazione prima e dopo il periodo riproduttivo.



# Dato utile per la determinazione dell'incremento utile annuo

- Rapporto tra soggetti giovani ed adulti



# **Esempio di calcolo dell'incremento utile annuo**


- Soggetti presenti al termine del periodo riproduttivo (fine settembre) = n° 100
- Soggetti adulti n° 40
- Soggetti giovani n° 60
- **Incremento utile = 150%**

# Metodi per la classificazione dei soggetti adulti e giovani


- Valutazione visiva  
(Attendibilità al 70%)




- Lettura del tubercolo di Stroh  
(Attendibilità al 98%)



- Analisi del cristallino dell'occhio  
(Attendibilità al 100%)




# Il tubercolo di Stroh



# Il tubercolo di Stroh



# Il tubercolo di Stroh



# I dati del 2006 nell'ATC MO1

- N° 49 reperti raccolti

## Classificazione

- N° 18 adulti
- N° 31 giovani



## Incremento utile annuo:

- 172%

# I dati del 2007 nell'ATC MO1

- N° 105 reperti raccolti

## Classificazione

- N° 30 adulti
- N° 75 giovani



## Incremento utile annuo:

- 250%

# I dati del 2007 nell'ATC MO2

- N° 113 reperti raccolti

## Classificazione

- N° 32 adulti
- N° 81 giovani



## Incremento utile annuo:

- 253%

# Periodi e tassi di riproduzione

<i>Mese di nascita</i>	<i>Numero reperti</i>	<i>Percentuale di riproduzione</i>
<i>Febbraio</i>	8	5,1%
<i>Marzo</i>	12	7,7%
<i>Aprile</i>	19	12,2%
<i>Maggio</i>	43	27,6%
<i>Giugno</i>	35	22,4%
<i>Luglio</i>	20	12,8%
<i>Agosto</i>	12	7,7%
<i>Settembre</i>	7	4,5%
<i>Totali</i>	156	100%

# Una nuova domande

- Quali sono i fattori che annualmente concorrono alla ricostituzione della popolazione di lepri sul territorio di caccia ?



# ATC MO1 *carniere* 2006

- Lepri di cattura lanciate nel 2006 = n° 886
- Indice di incremento utile registrato = 172%

Produzione del 2006 sulla base del lanciato

$$886 \times 172\% = 2.410$$

**Lepri abbattute = 5.705**

# ATC MO1 *carniere* 2007

- Lepri di cattura lanciate nel 2007 = n° 965
- Indice di incremento utile registrato = 250%

Produzione del 2007 sulla base del lanciato

$$965 \times 250\% = 3.377$$

**Lepri abbattute = 6.221**

# Nuove domande

- Quale è la reale potenzialità produttiva di lepri del nostro territorio ?
- Da dove deriva il 50% del cagniere annuale ?



# Ipotesi

- Dall'irradiamento naturale delle "riserve"?
- Dalla presenza di una popolazione residua di lepri in territorio di caccia a fine stagione ?
- Da entrambi i fattori ?
- Da altri fattori ?

# Irradiazione naturale dalle “riserve”

- È valutabile avendo a disposizione i dati dei censimenti primaverili ed autunnali e l'indice di incremento utile annuo.



# Alcuni esempi

- N° lepri censite ad aprile = 100
- Applicazione dell'indice di incremento utile registrato quell'anno = 200%
- N° lepri censite a novembre = 200
- Differenze e valutazioni conseguenti  
Dispersione di circa 100 soggetti pari ad un tasso di irradiazione del 33%

# Tabella degli indici di irradiazione

<b>Tipo di istituto</b>	<b>Indice di irradiazione</b>
“Riserva finalizzata all’irradiazione”	dal 50 all’80 %
“Riserva a finalità mista cattura ed irradiazione”	dal 30 al 40 %
“Riserva finalizzata alla cattura a fondo”	dal 10 al 20 %

# Presenza di una popolazione residua di lepri in territorio di caccia




- È valutabile effettuando censimenti in territorio di caccia immediatamente dopo la chiusura della stagione venatoria (primi di dicembre)

# Il Tubercolo di Stroh

## raccolta reperti 2008

Il reperto consiste nell'avambraccio della lepre che deve essere tagliato appena sopra al gomito, vedi figura a seguire



UNA sola gamba per ogni lepre

I reperti debbono essere di animali abbattuti ESCLUSIVAMENTE entro settembre, ovvero nelle prime 3 giornate di caccia alla stanziale

**21** domenica  
s. Matteo Apostolo

**25** giovedì  
s. Alberto

**28** domenica  
s. Venceslao

I reperti dovranno confluire all'Ufficio ATC MO1 anche attraverso personale che si rende disponibile alla raccolta. A seguire elenchiamo alcuni recapiti utili allo scopo:

**Ufficio ATC MO1**, Via Santo Fattori, 9 Cavezzo MO  
Tel. 0535.49185 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30  
oppure Cell.3357818448 – Lodi Maurizio

**Capi Distretto**

A – Rebecchi Alberto - 338.2456379  
B – Ribaldi Amos - 338.9375091  
C – Gennari Nino - 333.4770655  
D – Fregni Luciano - 338.8405516  
E – Balanzoni Giulio - 349.7323528

Parlando un po'  
di lepri .....

Serata divulgativa con gli  
appassionati cacciatori dell'ATC MO1